

Aribec

50 microgrammi/g + 0,5 mg/g

Efficacia confermata clinicamente nel trattamento della psoriasi del cuoio capelluto negli adulti e della psoriasi a placche (*psoriasis vulgaris*) da media a moderata di altre parti del corpo negli adulti¹.

Inibizione della proliferazione dei cheratinociti¹

Calcipotriolo

Betametasone

Attività immunosoppressiva, antiinfiammatoria e antipruriginosa¹

Rielaborazione grafica di informazione da RCP¹

Aribec

50 microgrammi/g + 0,5 mg/g



Tubo da 30 g
Prescrivibile SSN classe A - R/RR
Prezzo al pubblico 20,21 euro

Indicazioni terapeutiche¹

Trattamento per via topica della psoriasi del cuoio capelluto negli adulti.

Trattamento topico per la psoriasi a placche (*psoriasis vulgaris*) da media a moderata di altre parti del corpo negli adulti.

Posologia¹

Aribec deve essere applicato sulle aree interessate una volta al giorno. Il periodo di trattamento raccomandato è di 4 settimane per il cuoio capelluto e 8 settimane per le altre parti del corpo.

Se è necessario continuare o riprendere il trattamento dopo questo periodo di tempo, il trattamento deve essere continuato dopo il riesame medico e sotto regolare supervisione medica.

Bibliografia

¹ Aribec Riassunto delle caratteristiche di prodotto



QR code per RCP

Aribec

50 microgrammi/g + 0,5 mg/g



**Calcipotriolo betametasone
per il trattamento topico della psoriasi¹**

Per la salute della pelle scelgo

ARISTO

Deposito AIFA 10/02/2023

Codice materiale MK00048

Aribec

50 microgrammi/g + 0,5 mg/g

1 g di gel contiene 50 µg di calcipotriolo (come monoidrato) e 0,5 mg di betametasona (come dipropionato)¹

- **Tattamento topico della psoriasi del cuoio capelluto negli adulti¹**
- **Tattamento topico per la psoriasi a placche (*psoriasis vulgaris*) da media a moderata di altre parti del corpo negli adulti¹**

NON È NECESSARIO LAVARE I CAPELLI PRIMA DELL'APPLICAZIONE DI ARIBEC.



1. Agiti il flacone prima dell'uso.



2. Metta una goccia di Aribec sulla punta di un dito.



3. Applichi direttamente sulle zone del cuoio capelluto dove si sentono al tatto le placche e frizioni dolcemente Aribec gel sulla pelle.

In genere sono sufficienti 1-4 g (fino a 1 cucchiaino da tè), a seconda delle aree affette.

Per raggiungere un effetto ottimale, si raccomanda di non lavare i capelli subito dopo l'applicazione di Aribec. Lasciare che Aribec rimanga sul cuoio capelluto durante la notte o durante il giorno.

Quando si lavano i capelli dopo l'applicazione è utile seguire le seguenti istruzioni:



4. Utilizzi uno shampoo delicato sui capelli asciutti, specialmente sulle zone dove è stato applicato il gel.



5. Lasci agire lo shampoo sui capelli per un paio di minuti prima di lavare i capelli.



6. Lavi i capelli come al solito.

Rielaborazione grafica da RCP

1 volta al giorno (sera)

Il normale periodo di trattamento iniziale è di **4 settimane per le aree del cuoio capelluto e di 8 settimane per le altre parti del corpo**. Il gel deve rimanere applicato durante la notte o durante il giorno¹

- **Il medico** può decidere un diverso periodo di trattamento
- **Il medico** può decidere di ripetere il trattamento
- Non dovrebbero essere usati più di 15 grammi in un giorno¹

GRAVITÀ ALMENO LIEVE

Aribec

Superiore efficacia rispetto ai principi attivi in monoterapia sul cuoio capelluto¹

L'efficacia di calcipotriolo + betametasona 50 microgrammi/g + 0,5 mg/g gel 1 volta/die o è stata valutata in due studi clinici randomizzati, in doppio cieco, della durata di 8 settimane, in più di 2900 pazienti affetti da psoriasi del **cuoio capelluto di gravità almeno lieve**, secondo la scala Investigator's Global Assessment (IGA)¹.

I farmaci di confronto comprendevano¹

- betametasona dipropionato in un veicolo a base di gel,
 - calcipotriolo in un veicolo a base di gel
 - (in uno degli studi) solamente veicolo a base di gel
- tutti applicati 1 volta/die.

Calcipotriolo + betametasona 50 microgrammi/g + 0,5 mg/g gel è risultato significativamente più efficace rispetto ai farmaci di confronto già a partire dalla seconda settimana di trattamento¹

% di pazienti con patologia molto lieve o assente	Betametasona dipropionato e calcipotriolo gel in combinazione (n= 1.108)	Betametasona dipropionato (n= 1.108)	Calcipotriolo (n=558)	Gel veicolo (n=136)
2° settimana	53,2%*	42,8%*	17,2%*	11,8%*
8° settimana	69,8%*	62,5%*	40,1%*	22,8%*

*Combinazione significativamente superiore rispetto alle monoterapie

Rielaborazione grafica da RCP

GRAVITÀ ALMENO MODERATA

Aribec

Superiore efficacia rispetto a Calcipotriolo soluzione - psoriasi del cuoio capelluto¹

Un altro studio clinico randomizzato, in cieco per lo sperimentatore, in 312 pazienti con psoriasi del **cuoio capelluto** di gravità almeno moderata (valutazione IGA), ha confrontato Calcipotriolo + betametasona 50 microgrammi/g + 0,5 mg/g gel di combinazione 2 volte/die rispetto a Calcipotriolo soluzione fino a 8 settimane¹

Calcipotriolo + betametasona 50 microgrammi/g + 0,5 mg/g gel di combinazione è risultato significativamente più efficace di Calcipotriolo soluzione per il cuoio capelluto¹

% di pazienti con patologia molto lieve o assente	Betametasona dipropionato e calcipotriolo gel in combinazione (n=207)	Calcipotriolo soluzione per il cuoio capelluto (n=105)
8° settimana	68,6%**	31,4%**

**Combinazione significativamente superiore rispetto a calcipotriolo in monoterapia (P<0.001)

Rielaborazione grafica da RCP